



Cálculo Diferencial e Integral I

1ª Ficha de problemas

Princípio de indução matemática. O axioma do supremo e suas consequências

1. Usando o princípio de indução matemática, prove as seguintes afirmações:

a)

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2, \quad n \in \mathbb{N}$$

Sugestão: Recorde a definição de somatório,

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1, \quad n = 1$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} a_k = \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

b)

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

2. Considere os seguintes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |x| + 1 > 2x\} \quad B = \{x \in \mathbb{R} : x^4 + 3x^3 + 2x^2 \leq 0\} \quad C = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

(a) Mostre que $A =] - \infty, 1[$ e $B = [-2, -1] \cup \{0\}$. Verifique se os conjuntos $A, B, C, A \cap B \cap C$, são majorados ou minorados e caso sejam, indique o conjunto dos majorantes e dos minorantes dos mesmos.

(b) Caso existam, determine o supremo, infimo, máximo e mínimo de cada um dos conjuntos $A, B, C, A \cap B \cap C$.

3. Mostre que, se X e Y são subconjuntos de \mathbb{R} , tais que, $\sup X > \inf Y$, existem $x \in X$ e $y \in Y$, tais que, $y < x$