

1. Sobre a mesma equação diferencial,  $y'' + y = 0$ , resolva os seguintes problemas de fronteira ou mostre que não têm solução.

$$\begin{array}{ll} a) & y(0) = 0, \quad y'(\pi) = 1 \\ c) & y(0) = 0, \quad y(L) = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} b) & y'(0) = 1, \quad y'(\pi) = 0 \\ d) & y'(0) = 1, \quad y(L) = 0 \end{array}$$

2. Esboce o gráfico e calcule as séries de Fourier de:

$$\begin{array}{ll} a) & f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad f(x+2\pi) = f(x) \\ b) & f(x) = \begin{cases} x+L, & -L \leq x \leq 0, \\ L, & 0 < x < L \end{cases} \quad f(x+2L) = f(x) \\ c) & f(x) = \begin{cases} 0, & -2 \leq x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad f(x+4) = f(x) \end{array}$$

3. Usando séries de Fourier, encontre a solução formal dos PVI's:

$$y'' + \omega^2 y = f(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

onde

$$a) \quad f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nt) \quad b) \quad f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi, \\ 0 & t = 0, \pi, 2\pi, \\ -1, & \pi < t < 2\pi, \end{cases} \quad f(x+2\pi) = f(x)$$

4. Estabeleça a identidade de Parseval para as séries de Fourier i.e., mostre que, se

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

então

$$\frac{1}{L} \int_{-L}^L [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

5. Obtenha as seguintes séries para as seguintes funções:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases} & \text{séries do coseno, período 4} \\ f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ 1, & 1 < x < 2 \end{cases} & \text{séries do seno, período 4} \end{array}$$