Instituto Superior Técnico
Departamento de Matemática
Secção de Álgebra e Análise

Última actualização: 30/5/2003

ANÁLISE MATEMÁTICA IV – LEEC

RESOLUÇÃO DA FICHA 7
SÉRIES DE FOURIER E EDP'S

disponível em `http://www.math.ist.utl.pt/~acannas/AMIV`

(1) Determine o desenvolvimento em série de Fourier das seguintes funções:
(a) $f(x) = x$ para $x \in [-1, 1]$;
(b) $f(x) = x + 1$ para $x \in [-1, 1]$;
(c) $f(x) = \cos^3 x$ para $x \in [-\pi, \pi]$.

Resolução:

(a) *A série de Fourier de f é da forma*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)) \ .$$

Como $f(x)$ é ímpar, todos os a_n's são 0. Quanto aos b_n's, são dados pela fórmula

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-1}^{1} x \sin(n\pi x) dx \\ &= 2\int_{0}^{1} x \sin(n\pi x) dx \qquad \textit{porque } x\sin(n\pi x) \textit{ é par} \\ &= 2\left(-\frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi}\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} dx \right) \\ &= -\frac{2(-1)^n}{n\pi} + 0 \ = \ \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \ . \end{aligned}$$

Conclui-se que o desenvolvimento de Fourier de f para $x \in [-1, 1]$ é

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin(n\pi x) \ .$$

(b) *A função x já foi desenvolvida em série na alínea anterior, pelo que nos resta desenvolver a função constante igual a 1 no intervalo $[-1, 1]$. Por unicidade do desenvolvimento de Fourier, há uma única escolha possível para a_n's e b_n's tais que*

$$1 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)) \ .$$

Claramente uma escolha possível é $a_0 = 2$ e $a_n = b_n = 0$ para $n \geq 1$. Por unicidade conclui-se que o desenvolvimento de Fourier da função constante igual a 1 é $1 = \frac{2}{2}$, e portanto o desenvolvimento de Fourier de f é

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin(n\pi x) \ .$$

(c) *O desenvolvimento de Fourier de f é da forma*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right) \ .$$

Por unicidade do desenvolvimento de Fourier, qualquer desenvolvimento desta forma que se obtenha será o desenvolvimento de Fourier. Pela fórmula de DeMoivre tem-se:

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^3 &= \cos(3x) + i \sin(3x) \\ \cos^3 x - 3\cos x \sin^2 x + i(3\cos^2 x \sin x - \sin^3 x) &= \cos(3x) + i \sin(3x) \end{aligned}$$

donde, igualando as partes reais,

$$\begin{aligned} \cos^3 x - 3\cos x(1 - \cos^2 x) &= \cos(3x) \\ 4\cos^3 x &= 3\cos x + \cos(3x) \\ \cos^3 x &= \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos(3x) \ . \end{aligned}$$

Uma vez que este é um desenvolvimento da forma pretendida, conclui-se que é este o desenvolvimento de Fourier. Isto é, tem-se $b_n = 0$ para todo o $n \geq 1$, $a_n = 0$ para $n \neq 1, 3$ e $a_1 = \frac{3}{4}$, $a_3 = \frac{1}{4}$.

□

Comentário: *Nas alíneas (b) e (c) do exercício anterior poder-se-ia também ter utilizado as fórmulas integrais para calcular os coeficientes a_n e b_n, mas esse processo seria mais trabalhoso.* ♢

(2) Determine o desenvolvimento em série de senos das seguintes funções:

(a) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{se } 1 < x \leq 2 \ ; \end{cases}$

(b) $f(x) = \cos x$ para $x \in [0, 2\pi]$.

Resolução:

(a) *O desenvolvimento de f em série de senos no intervalo $[0, 2]$ é da forma*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \ .$$

Os coeficientes b_n são dados pela fórmula

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \, dx \\ &= \int_0^1 x \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \, dx + \int_1^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \, dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} x \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \, dx - \frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\Big|_1^2 \\ &= -\frac{2}{n\pi}\cos(n\pi) + \frac{4}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &= \frac{4\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 2n\pi(-1)^n}{n^2\pi^2} \ . \end{aligned}$$

Conclui-se que o desenvolvimento de f em série de senos é dado pela expressão

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 2n\pi(-1)^n}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \ .$$

(b) *O desenvolvimento de f em série de senos no intervalo $[0, 2\pi]$ é da forma*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \ .$$

Os coeficientes b_n são dados pela fórmula

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \cos x \sin\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx \ . \end{aligned}$$

Para calcular a primitiva anterior pode integrar-se duas vezes por partes e obtém-se

$$\left(1 - \frac{n^2}{4}\right)\int \cos x \sin\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx = \sin x \sin\left(\frac{nx}{2}\right) + \frac{n}{2}\cos x \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \ .$$

Assim, para $n \neq 2$, tem-se

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\cdot\frac{4}{4-n^2}\left(\sin x \sin\left(\frac{nx}{2}\right) + \frac{n}{2}\cos x\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\right)\Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{2((-1)^n - 1)n}{\pi(4-n^2)} \end{aligned}$$

e, para $n = 2$, tem-se

$$b_2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \cos x \sin x\ dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin(2x)\ dx = 0 \ .$$

Conclui-se que o desenvolvimento de f em série de senos é dado pela expressão

$$f(x) = \sum_{n=1, n\neq 2}^{+\infty} \frac{2n((-1)^n - 1)}{\pi(4-n^2)} \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \ .$$

□

(3) Determine o desenvolvimento em série de co-senos das seguintes funções:
(a) $f(x) = x^2$ para $x \in [0, 1]$;
(b) $f(x) = e^{2x}$ para $x \in [0, 2\pi]$.

Resolução:

(a) *O desenvolvimento de f em série de co-senos no intervalo $[0, 1]$ é da forma*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\pi x) \ .$$

Os coeficientes a_n são dados pela fórmula

$$a_n = \frac{2}{1}\int_0^1 f(x)\cos(n\pi x)\ dx \ .$$

Donde

$$a_0 = 2\int_0^1 x^2\ dx = \frac{2}{3}\ ,$$

e, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_n &= 2\int_0^1 x^2\cos(n\pi x)\ dx \\ &= 2\left(x^2\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\bigg|_0^1 - \int_0^1 2x\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\ dx\right) \\ &= -\frac{4}{n\pi}\int_0^1 x\sin(n\pi x)\ dx \\ &= -\frac{4}{n\pi}\left(-\frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi}\bigg|_0^1 + \int_0^1 \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\ dx\right) \\ &= \frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2}\ . \end{aligned}$$

Conclui-se que o desenvolvimento de f *em série de co-senos no intervalo* $[0,1]$ *é dado por*

$$f(x) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2}\cos(n\pi x)\ .$$

(b) *O desenvolvimento de* f *em série de co-senos no intervalo* $[0,2\pi]$ *é da forma*

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\ .$$

Os coeficientes a_n *são dados pela fórmula*

$$a_n = \frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx\ .$$

Donde

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} e^{2x}\ dx = \frac{e^{4\pi}-1}{2\pi}\ ,$$

e, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} e^{2x}\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx \\ &= \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\left(\int_0^{2\pi} e^{2x+i\frac{nx}{2}}\ dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\left(\frac{e^{\left(2+\frac{n}{2}i\right)x}}{2+\frac{n}{2}i}\bigg|_0^{2\pi}\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\left(\frac{e^{4\pi+n\pi i}-1}{2+\frac{n}{2}i}\right) \\ &= \frac{8\left((-1)^n e^{4\pi}-1\right)}{\pi(16+n^2)}\ . \end{aligned}$$

Conclui-se que o desenvolvimento de f *em série de co-senos é dado pela expressão*

$$f(x) = \frac{e^{4\pi}-1}{4\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{8\left((-1)^n e^{4\pi}-1\right)}{\pi(16+n^2)}\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\ .$$

□

(4) Recorrendo ao método de separação de variáveis, determine uma solução do seguinte problema de valor na fronteira para a equação do calor:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0 \\ u(0,x) = \sin(3x) - \frac{1}{2}\sin(8x) \end{cases}$$

para $0 \leq x \leq \pi$ e $t \geq 0$.

Resolução: *Começa-se por procurar soluções da equação diferencial parcial da forma* $u(t,x) = T(t)X(x)$. *Substituindo na equação tem-se*

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}\left(T(t)X(x)\right) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(T(t)X(x)\right) \\ \iff \quad & T'(t)X(x) = T(t)X''(x) \\ \iff \quad & \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \text{ para } T(t), X(x) \neq 0 \\ \iff \quad & \frac{T'(t)}{T(t)} = k = \frac{X''(x)}{X(x)} \text{ para algum } k \in \mathbb{R} \\ \implies \quad & \begin{cases} T'(t) = kT(t) \\ X''(x) = kX(x) \end{cases} \text{ para algum } k \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tendo em conta as condições na fronteira,

$$\begin{aligned} u(t,0) = u(t,\pi) = 0 \quad & \iff \quad T(t)X(0) = T(t)X(\pi) = 0 \\ & \iff \quad T(t) = 0 \ \ \forall t \text{ ou } X(0) = X(\pi) = 0 \ , \end{aligned}$$

conclui-se que para obter soluções não identicamente nulas tem de ser $X(0) = X(\pi) = 0$. *Por sua vez isto implica que a constante* k *acima tem de ser negativa (se* $k \geq 0$ *a única solução da equação* $X''(x) - kX(x) = 0$ *que verifica* $X(0) = X(\pi) = 0$ *é a solução identicamente nula).*
Portanto

$$X(x) = c_1 \cos(\sqrt{-k}x) + c_2 \sin(\sqrt{-k}x) \ ,$$

e substituindo nas condições fronteira obtém-se

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(\pi) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sin(\sqrt{-k}\pi) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \text{ ou } \sin(\sqrt{-k}\pi) = 0 \ . \end{cases}$$

Obtêm-se assim soluções não nulas para a equação diferencial para $X(x)$ *e para a condição fronteira quando*

$$\sqrt{-k}\pi = n\pi \iff k = -n^2 \text{ para } n = 1, 2, \ldots$$

e para cada um destes valores de k *obtêm-se como soluções do sistema acima múltiplos reais de*

$$X_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sin(nx) \qquad \text{e} \qquad T_n(t) \stackrel{\text{def}}{=} e^{-n^2 t} \ .$$

Isto é, para cada $n = 1, 2, \ldots$ *obtém-se a seguinte solução "básica" da equação diferencial parcial satisfazendo a condição na fronteira:*

$$u_n(t,x) \stackrel{\text{def}}{=} T_n(t)X_n(x) = e^{-n^2 t}\sin(nx) \ .$$

Finalmente, determina-se coeficientes $d_n \in \mathbb{R}$ tais que a condição inicial seja satisfeita pela combinação linear formal

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(t,x) \ .$$

Tem-se

$$\begin{aligned} & u(0,x) = \sin(3x) - \frac{1}{2}\sin(8x) \\ \iff & \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(0,x) = \sin(3x) - \frac{1}{2}\sin(8x) \\ \iff & \sum_{n=1}^{+\infty} d_n \cdot 1 \cdot \sin(nx) = \sin(3x) - \frac{1}{2}\sin(8x) \ , \end{aligned}$$

pelo que $d_3 = 1, d_8 = -\frac{1}{2}$ e $d_n = 0$ para $n \neq 3, 8$. Conclui-se que a solução do problema do enunciado é

$$u(t,x) = e^{-9t}\sin(3x) - \frac{1}{2}e^{-64t}\sin(8x) \ .$$

□

(5) Seja c um parâmetro real positivo. Recorrendo ao método de separação de variáveis determine uma solução do seguinte problema para a equação das ondas:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(t,0) = u(t,2\pi) = 1 \\ u(0,x) = \cos x \\ \frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = 0 \end{cases}$$

para $0 \leq x \leq 2\pi$ e $t \geq 0$ (verificando a equação diferencial para $0 < x < 2\pi$).

> **Sugestão:** Comece por determinar uma solução estacionária (isto é, da forma $u(t,x) = v(x)$) da equação diferencial que satisfaça as condições na fronteira para $x = 0$ e $x = 2\pi$. Aproveite o resultado do exercício (2)(b).

Resolução: *Começa-se por determinar uma solução estacionária da equação diferencial parcial que satisfaz a condição na fronteira. Substituindo $u(t,x) = v(x)$ em*

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(t,0) = u(t,2\pi) = 1 \ , \end{cases}$$

obtém-se

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(v(x)) = c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(v(x)) \\ v(0) = v(2\pi) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} v(x) = ax + b \\ v(0) = v(1) = 1 \end{cases} \iff v(x) = 1 \ .$$

Voltando ao problema inicial e escrevendo

$$u(t,x) = v(x) + u_{_H}(t,x) = 1 + u_{_H}(t,x) \ ,$$

tem-se que $u_{_H}(t,x)$ é uma solução do seguinte problema com condições na fronteira homogéneas:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_{_H}}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u_{_H}}{\partial x^2} \\ u_{_H}(0,x) = \cos x - 1 \\ \frac{\partial u_{_H}}{\partial t}(0,x) = 0 \\ u_{_H}(t,0) = u_{_H}(t,2\pi) = 0 \ . \end{cases}$$

Para resolver este problema, começa-se por procurar soluções da equação diferencial parcial e das condições fronteira da forma $u_H(t,x) = T(t)X(x)$. *Substituindo na equação tem-se*

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(T(t)X(x)\right) = c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(T(t)X(x)\right) \\
\iff \quad & T''(t)X(x) = c^2 T(t)X''(x) \\
\iff \quad & \frac{T'(t)}{T(t)} = c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} \text{ para } T(t), X(x) \neq 0 \\
\iff \quad & \frac{T'(t)}{T(t)} = k = c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} \text{ para algum } k \in \mathbb{R} \\
\implies \quad & \begin{cases} T'(t) = kT(t) \\ X''(x) = \frac{k}{c^2} X(x) \end{cases} \text{ para algum } k \in \mathbb{R} \ .
\end{aligned}$$

Tendo em conta as condições na fronteira

$$u_H(t,0) = u_H(t,2\pi) = 0 \iff T(t)X(0) = T(t)X(2\pi) = 0$$

$$T(t) = 0 \ \forall t \text{ ou } X(0) = X(2\pi) = 0 \ ,$$

conclui-se que para obter soluções não identicamente nulas tem de ser $X(0) = X(2\pi) = 0$. *Por sua vez isto implica que a constante* k *acima tem de ser negativa (se* $k \geq 0$ *a única solução da equação* $X''(x) - \frac{k}{c^2}(X(x) = 0$ *que verifica* $X(0) = X(2\pi) = 0$ *é a solução identicamente nula).*
Portanto

$$X(x) = c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{-k}}{c}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{-k}}{c}x\right)$$

e substituindo nas condições na fronteira obtém-se

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(2\pi) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{-k}}{c} \cdot 2\pi\right) = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \text{ ou } \sin\left(\frac{\sqrt{-k}}{c} \cdot 2\pi\right) = 0 \ . \end{cases}$$

Obtêm-se assim soluções não nulas para a equação diferencial para X *e para a condição fronteira quando*

$$2\sqrt{-k}\pi = nc\pi \iff k = -\frac{n^2c^2}{4} \text{ para } n = 1, 2, \ldots$$

e, para cada um destes valores de k, *obtêm-se como soluções da equação para* $X(x)$ *satisfazendo as condições fronteira as funções múltiplas das seguintes:*

$$X_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \ .$$

Quanto à equação para $T(t)$,

$$T''(t) = -\frac{n^2c^2}{4}T(t) \iff T(t) = c_3 \cos\left(\frac{nct}{2}\right) + c_4 \sin\left(\frac{nct}{2}\right) \ .$$

No entanto, a condição inicial

$$\frac{\partial u_H}{\partial t}(0,x) = T'(0)X(x) = 0$$

implica, para soluções não identicamente nulas, que seja $T'(0) = 0$*, ou seja,* $c_4 = 0$*. Assim* $T(t)$ *deve ser múltiplo de*

$$T_n(t) \stackrel{\text{def}}{=} \cos\left(\frac{nct}{2}\right) \ .$$

Isto é, para cada $n = 1, 2, \ldots$ *obtém-se a seguinte solução da equação diferencial parcial satisfazendo a condição na fronteira e a condição inicial respeitante à derivada em ordem a* t*:*

$$u_n(t,x) \stackrel{\text{def}}{=} T_n(t)X_n(x) = \cos\left(\frac{nct}{2}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \ .$$

Finalmente, determina-se coeficientes $d_n \in \mathbb{R}$ *tais que a condição inicial não homogénea seja satisfeita por*

$$u_{_H}(t,x) = \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(t,x) \ .$$

Tem-se

$$\begin{aligned} u_{_H}(0,x) = \cos x - 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(0,x) = \cos x - 1 \\ &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} d_n \sin\left(\frac{nx}{2}\right)\cdot 1 = \cos x - 1 \ . \end{aligned}$$

Portanto os d_n*'s são os coeficientes do desenvolvimento da função* $\cos x - 1$ *em série de senos no intervalo* $[0, 2\pi]$*. Na alínea (2)(b) foi já calculado o desenvolvimento de* $\cos x$ *em série de senos neste intervalo pelo que resta fazer o mesmo para a função constante igual a* -1*:*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (-1)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\ dx = \frac{1}{n\pi}\cos\left(\frac{nx}{2}\right)\Big|_0^{2\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} \ ,$$

donde se conclui

$$-1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}\sin\left(\frac{nx}{2}\right)$$

e portanto, tendo em conta que para n *par os coeficientes das séries de senos das funções* $\cos x$ *e* -1 *se anulam, tem-se*

$$\cos x - 1 = \sum_{n=1, n \text{ ímpar}}^{+\infty} -\left(\frac{4n}{\pi(4-n^2)} + \frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \ ,$$

isto é,

$$d_n = \begin{cases} -\frac{4n}{\pi(4-n^2)} - \frac{2}{n\pi} & \text{se } n \text{ ímpar} \\ 0 & \text{se } n \text{ par} \ . \end{cases}$$

Conclui-se que

$$u_{_H}(t,x) = \sum_{n=1, n \text{ ímpar}}^{+\infty} -\left(\frac{4n}{\pi(4-n^2)} + \frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\cos\left(\frac{nct}{2}\right)$$

e que a solução do problema do enunciado é

$$u(t,x) = 1 + \sum_{n=1, n \text{ ímpar}}^{+\infty} -\left(\frac{4n}{\pi(4-n^2)} + \frac{2}{n\pi}\right)\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\cos\left(\frac{nct}{2}\right) \ .$$

□

(6) Recorrendo ao método de separação de variáveis determine uma solução para o seguinte problema de valor na fronteira:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u \\ u(x,0) = u(x,1) = u(0,y) = 0 \\ u(1,y) = y \end{cases}$$

para $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$ (verificando a equação diferencial para $0 < x < 1$ e $0 < y < 1$).

Resolução: *Começa-se por procurar soluções da equação diferencial parcial da forma* $u(x,y) = X(x)Y(y)$. *Substituindo na equação tem-se*

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2}{\partial x^2}(X(x)Y(y)) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(X(x)Y(y)) = X(x)Y(y) \\ \iff \quad & X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = X(x)Y(y) \\ \iff \quad & \frac{X''(x)}{X(x)} - 1 = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} \text{ para } Y(y), X(x) \neq 0 \\ \iff \quad & \frac{X''(x)}{X(x)} - 1 = k = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} \text{ para algum } k \in \mathbb{R} \\ \implies \quad & \begin{cases} X''(x) = (k+1)X(x) \\ Y''(y) = -kY(y) \end{cases} \text{ para algum } k \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tendo em conta as condições na fronteira

$$\begin{aligned} u(x,0) = u(x,1) = 0 & \iff X(x)Y(0) = X(x)Y(1) = 0 \\ & \iff X(x) = 0 \ \forall x \text{ ou } Y(0) = Y(1) = 0 \ , \end{aligned}$$

conclui-se que para obter soluções não identicamente nulas tem de ser $Y(0) = Y(1) = 0$. *Por sua vez isto implica que a constante* k *acima tem de ser positiva (se* $k \leq 0$ *a única solução da equação* $Y''(x) + kY(y) = 0$ *que verifica* $Y(0) = Y(1) = 0$ *é a solução identicamente nula).*
Portanto

$$Y(y) = c_1 \cos(\sqrt{k}y) + c_2 \sin(\sqrt{k}y)$$

e substituindo nas condições na fronteira obtém-se

$$\begin{cases} Y(0) = 0 \\ Y(1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sin(\sqrt{k}) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \text{ ou } \sin(\sqrt{k}) = 0 \end{cases}$$

Obtêm-se assim soluções não nulas para a equação diferencial para X *e para a condição fronteira quando*

$$\sqrt{k} = n\pi \iff k = n^2\pi^2 \text{ para } n = 1, 2, \ldots$$

e para cada um destes valores de k *obtêm-se como soluções da equação para* $Y(y)$ *com as condições na fronteira os múltiplos reais de*

$$Y_n(y) \stackrel{\text{def}}{=} \sin(n\pi y) \ .$$

Quanto à equação para $X(x)$

$$\begin{aligned} & X''(x) = (1 + n^2\pi^2)X(x) \\ \iff \quad & X(x) = c_3 \cosh(\sqrt{1+n^2\pi^2}x) + c_4 \sinh(\sqrt{1+n^2\pi^2}x) \ . \end{aligned}$$

No entanto, a condição

$$u(0,y) = X(0)Y(y) = 0$$

implica, para soluções não identicamente nulas, que seja $X(0) = 0$*, ou seja,* $c_3 = 0$*. Assim* $X(x)$ *deverá ser múltiplo real de*

$$X_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2}x) \ .$$

Isto é, para cada $n = 1, 2, \ldots$ *obtém-se a seguinte solução da equação diferencial parcial satisfazendo as condições na fronteira homogéneas:*

$$u_n(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} X_n(x)Y_n(y) = \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2}x)\sin(n\pi y) \ .$$

Finalmente, determina-se coeficientes $d_n \in \mathbb{R}$ *tais que a condição na fronteira não homogénea seja satisfeita por*

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(x, y) \ .$$

Tem-se

$$\begin{aligned} u(1, y) = y \quad &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} d_n u_n(1, y) = y \\ &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} d_n \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2})\sin(n\pi y) = y \ . \end{aligned}$$

Logo, $d_n \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2})$ *são os coeficientes do desenvolvimento de* y *em série de senos no intervalo* $[0, 1]$*. Donde,*

$$d_n \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2}) = \frac{2}{1}\int_0^1 y\sin(n\pi y)\ dy = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

e portanto

$$d_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi\sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2})} \ .$$

Conclui-se que a solução do problema do enunciado é

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi\sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2})} \sinh(\sqrt{1 + n^2\pi^2}x)\sin(n\pi y) \ .$$

□