

ANÁLISE MATEMÁTICA IV

CIVIL

FICHA SUPLEMENTAR 1

NÚMEROS COMPLEXOS E FUNÇÕES COMPLEXAS

Números Complexos

- (1) Descreva as regiões do plano complexo definidas por

$$|z - i| \leq c|z|,$$

onde  $c$  é um número real não negativo.

- (2) Resolva a equação quadrática

$$z^2 + 2iz + i - 1 = 0.$$

**Resolução:** Pela fórmula resolvente para a equação quadrática,

$$\begin{aligned} z^2 + 2iz + i - 1 = 0 &\iff z = -i \pm \sqrt{-i} \\ &\iff z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}-2}{2}i \quad \text{ou} \quad z = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}+2}{2}i \end{aligned}$$

□

**Comentário:** A fórmula resolvente para a equação quadrática vale para equações com coeficientes complexos. A sua demonstração resume-se a:

$$az^2 + bz + c = a \left( z - \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left( z - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

onde  $\sqrt{\cdot}$  e  $-\sqrt{\cdot}$  representam as duas raízes quadradas de um número complexo. ◇

- (3) Determine todas as soluções  $z \in \mathbb{C}$  da equação

$$z^6 = (i + 2)^3 + \frac{1 - 28i}{2 - i}.$$

**Resolução:** Primeiro simplifica-se o lado direito:

$$(i + 2)^3 + \frac{1 - 28i}{2 - i} = i^3 + 6i^2 + 12i + 8 + \frac{30 - 55i}{5} = 8.$$

As soluções da equação são portanto as raízes sextas de 8, ou seja,

$$z = \sqrt[6]{8} e^{i \frac{k\pi}{3}} \quad \text{com} \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

□

- (4) Resolva a seguinte equação

$$1 + 3z + 3z^2 + z^3 = 4\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{2}} (e^{i\frac{\pi}{2}} + e^{-i3\pi}).$$

### Diferenciabilidade

- (5) (a) Seja  $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  uma aplicação linear onde  $\mathbb{C}$  é considerado espaço vectorial de dimensão 2 sobre  $\mathbb{R}$ . Seja  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  a matriz que representa  $T$  relativamente à base  $1, i$  de  $\mathbb{C}$ , ou seja,  $T(x + yi) = (ax + by) + (cx + dy)i$ . Mostre que a aplicação  $T$  é multiplicação por um número complexo se e só se

$$a = d \quad \text{e} \quad b = -c .$$

- (b) Uma função analítica  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  considerada como uma função  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tem por derivada em cada  $z_0$  uma aplicação linear (a sua *jacobiana*),

$$Df_{z_0} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 .$$

A aplicação  $Df_{z_0}$  corresponde à multiplicação por um número complexo,  $f'(z_0)$ . Qual é esse número em termos das entradas de  $Df_{z_0}$ ?

#### **Resolução:**

- (a) *Suponha-se que  $T$  é multiplicação por um número complexo,  $a + ci$ . Então*

$$T(x + yi) = (a + ci)(x + yi) = (ax - cy) + (cx + ay)i .$$

*Relativamente à base  $1, i$  de  $\mathbb{C}$ , fica*

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -c \\ c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} ,$$

*ou seja, as entradas da diagonal são iguais e as da anti-diagonal são simétricas. Suponha-se, reciprocamente, que, relativamente à base  $1, i$  de  $\mathbb{C}$ , a aplicação linear  $T$  é dada por uma matriz*

$$\begin{bmatrix} a & -c \\ c & a \end{bmatrix} ,$$

*ou seja,*

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -c \\ c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax - cy \\ cx + ay \end{bmatrix} .$$

*Então  $T(x + yi) = (ax - cy) + (cx + ay)i = (a + ci)(x + yi)$ , pelo que  $T$  é multiplicação pelo número complexo  $a + ci$ .*

- (b) *Considerando a função complexa de variável complexa*

$$f : \quad \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ x + yi \longmapsto u(x + yi) + iv(x + yi)$$

*como uma função vectorial real de duas variáveis reais,*

$$f : \quad \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (u(x, y), v(x, y)) ,$$

*a sua jacobiana no ponto  $(x_0, y_0)$  correspondente a  $z_0 = x_0 + iy_0$  é*

$$Df_{z_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} .$$

De acordo com a alínea (a), conclui-se que  $Df_{z_0}$  se traduz na multiplicação pelo número complexo

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

(onde  $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$  e  $\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$ ).

□

### Equações de Cauchy-Riemann

(6) Use as equações de Cauchy-Riemann para decidir sobre a analiticidade das seguintes funções (onde  $z = x + yi$ ):

(a)  $f(z) = |z|^2 z = x^3 + xy^2 + (x^2y + y^3)i$ ;

(b)  $f(z) = e^{x^2-y^2} \left( \cos^2(xy) - \frac{1}{2} + i \cos(xy) \sin(xy) \right)$ .

(7) Determine o domínio de diferenciabilidade das seguintes funções:

(a)  $f(z) = e^{xy} - e^{-xy} + xyi$ ;

(b)  $f(z) = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{y}{x^2+y^2}i$  (para  $z \neq 0$ );

onde  $x = \operatorname{Re}z$  e  $y = \operatorname{Im}z$ .

#### **Resolução:**

(a) As equações de Cauchy-Riemann são necessárias para a diferenciabilidade. A função

$$f(x + iy) = \underbrace{e^{xy} - e^{-xy}}_{u(x,y)} + \underbrace{xy}_{v(x,y)}i$$

não satisfaz as equações de Cauchy-Riemann fora da origem porque:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} &\iff \begin{cases} ye^{xy} + ye^{-xy} = x \\ -xe^{xy} - xe^{-xy} = y \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} xy(e^{xy} + e^{-xy}) = x^2 \\ xy(e^{xy} + e^{-xy}) = -y^2 \end{cases} \\ &\implies x^2 = -y^2 \implies x = y = 0 \end{aligned}$$

Na origem as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, e na origem  $f$  é de facto diferenciável porque

$$\begin{aligned} &\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{xy} - e^{-xy} + ixy}{x + iy} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{[(e^{xy} - e^{-xy})x + xy^2] + i[x^2y - (e^{xy} - e^{-xy})y]}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2x^2y + xy^2 + (\dots)}{x^2 + y^2} + i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{x^2y - 2xy^2 + (\dots)}{x^2 + y^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

onde (...) representa termos de ordem superior que não contribuem para o limite. Conclui-se que  $f$  é diferenciável apenas em 0.

**Comentário:** Em alternativa, podia-se invocar o teorema que afirma que, quando as derivadas parciais são contínuas, as equações de Cauchy-Riemann são também uma condição suficiente para a diferenciabilidade; ver, por exemplo, p.26 de Complex Analysis por L. Ahlfors. Este resultado é aplicado na alínea seguinte. ◇

- (b) Quando as partes real e imaginária de uma função complexa são continuamente diferenciáveis, as equações de Cauchy-Riemann são suficientes para a diferenciabilidade. Neste caso a função  $f$  tem derivadas contínuas em todo o seu domínio e satisfaz sempre as equações de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial v}{\partial x}.\end{aligned}$$

Conclui-se que  $f$  é diferenciável em todo o seu domínio.

**Comentário:** A função dada é igual a  $f(z) = \frac{1}{z}$ , cuja derivada é  $-\frac{1}{z^2}$  para qualquer  $z \neq 0$ . ◇

□

- (8) Considere a função  $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$u(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy(x + y)$$

- (a) Mostre que  $u$  é uma função harmónica.  
 (b) Determine a função harmónica conjugada,  $v$ , tal que  $v(0, 0) = 0$ .
- (9) (a) Mostre que, em coordenadas polares, as equações de Cauchy-Riemann se escrevem

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases}$$

onde  $x = \rho \cos \theta$  e  $y = \rho \sin \theta$ .

- (b) Mostre que a função

$$f(z) = 2 \log \frac{\rho}{2} + 2i\theta$$

é analítica em todo o seu domínio,  $\rho > 0$  e  $\theta \in ]0, 2\pi[$ .

- (c) Calcule a derivada,  $f'(z)$ , da função da alínea anterior em termos de  $z$ .

**Resolução:**

- (a) Se

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

então

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{bmatrix}$$

e

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \rho}{\partial x} & \frac{\partial \rho}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{\sin \theta}{\rho} & \frac{\cos \theta}{\rho} \end{bmatrix}.$$

As equações de Cauchy-Riemann ficam

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho} & (*) \\ -\frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho} = \frac{\partial v}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho} & (**) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \cos \theta (*) - \sin \theta (**) \\ \sin \theta (*) + \cos \theta (**) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases} \end{aligned}$$

- (b) Quando as partes real e imaginária de uma função complexa são continuamente diferenciáveis, as equações de Cauchy-Riemann são suficientes para a diferenciabilidade. Neste caso,

$$u = \operatorname{Re} f = 2 \log \frac{\rho}{2}$$

$$v = \operatorname{Im} f = 2\theta$$

e as equações de Cauchy-Riemann são sempre satisfeitas:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{2}{\rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial \rho} = 0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases}$$

Logo,  $f$  é analítica em todo o seu domínio.

(c)

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) + i \left( \frac{\partial v}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) \\ &= \left( \frac{2}{\rho} \cos \theta + 0 \right) + i \left( 0 - 2 \frac{\sin \theta}{\rho} \right) \\ &= \frac{2\rho \cos \theta - i2\rho \sin \theta}{\rho^2} \\ &= \frac{2\bar{z}}{|z|^2} \\ &= \frac{2}{z} \end{aligned}$$

**Comentário:** A função dada é igual a  $f(z) = \log \frac{z^2}{4}$ , onde  $\log$  representa o ramo principal do logaritmo.  $\diamond$

□

### Funções Trigonômicas

(10) Prove que

$$\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y .$$

**Resolução:**

$$\begin{aligned} \sin(x + iy) &= \frac{e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)}}{2i} \\ &= \frac{e^{ix-y} - e^{-ix+y}}{2i} \\ \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \frac{e^y + e^{-y}}{2} + i \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{e^{y+ix} - e^{y-ix} + e^{-y+ix} - e^{-y-ix} - e^{y+ix} - e^{y-ix} + e^{-y+ix} + e^{-y-ix}}{4i} \\ &= \frac{e^{-y+ix} - e^{y-ix}}{2i} \end{aligned}$$

□

(11) Mostre que, para  $z = x + yi$ , se tem

$$|\sin z|^2 = \sinh^2 y + \sin^2 x = \cosh^2 y - \cos^2 x .$$

(12) Estabeleça seguinte igualdade (onde  $z = x + yi$ )

$$|\cos z|^2 + |\sin z|^2 = \cosh(2y) .$$

### Exponenciais e Logaritmos

(13) Determine todas as soluções da equação

$$z^{2i} - 2z^i + 2 = 0 .$$

**Resolução:** Nas equações seguintes, o símbolo  $\text{Log } z$  representa genericamente os logaritmos de  $z$ .

$$\begin{aligned} z^{2i} - 2z^i + 2 = 0 &\iff (z^i)^2 - 2z^i + 2 = 0 \\ &\iff z^i = 1 \pm i \\ &\iff i \text{Log } z = \text{Log}(1 \pm i) \\ &\iff \text{Log } z = \frac{1}{i} [\ln |1 \pm i| + i(\arg(1 \pm i) + 2k\pi)] \\ &\iff \text{Log } z = -i \ln \sqrt{2} \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ &\iff z = e^{\pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi - i \ln \sqrt{2}} , \end{aligned}$$

com  $k \in \mathbb{Z}$ .

□

- (14) Se  $z$  e  $w$  forem números complexos com  $z \neq 0$ , o símbolo  $z^w$  representa o conjunto dos números complexos  $s$  que têm logaritmo da forma  $w\alpha$ , para algum logaritmo  $\alpha$  de  $z$ . (Ou seja,  $e^{w\alpha} = s$  e  $e^\alpha = z$  para algum número complexo  $\alpha$ .) Descreva o conjunto  $z^w$  quando  $z = 1$  and  $w = \frac{1}{3} + i$ .

**Resolução:** Tem-se que  $1 = e^{2k\pi i}$  para qualquer  $k \in \mathbb{Z}$ . Consequentemente:

$$\begin{aligned} 1^{\frac{1}{3}+i} &= e^{(\frac{1}{3}+i)\text{Log } 1} \\ &= e^{(\frac{1}{3}+i)2k\pi i} \\ &= e^{\frac{2k\pi}{3}i - 2k\pi} \\ &= e^{-2k\pi} \left( \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right), \end{aligned}$$

onde  $k \in \mathbb{Z}$ .

□