

# Análise Matemática IV

## Problemas para as Aulas Práticas

4 de Abril de 2005

### Semana 3

1. Determine os valores dos seguintes integrais:

a)  $\int_C |z| dz$  em que  $C$  é o semicírculo percorrido em sentido directo unindo  $-2i$  a  $2i$ .

b)  $\int_C z \cos z^2 dz$  em que  $C$  é o segmento de recta unindo  $0$  a  $\pi i$ .

**Resolução:**

(a) Uma parametrização possível para  $C$  é

$$z(\theta) = 2e^{i\theta} \quad , \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

pelo que

$$\int_C |z| dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |2e^{i\theta}| 2ie^{i\theta} d\theta = 8i$$

(b) Uma parametrização possível para  $C$  é

$$z(t) = it \quad , \quad 0 \leq t \leq \pi$$

pelo que

$$\int_C z \cos z^2 dz = \int_0^\pi it \cos(-t^2) i dt = -\frac{\text{sen}(\pi^2)}{2}$$

Note-se que atendendo ao facto da função  $z \cos z^2$  ser analítica na região interior a  $C$  (de facto é uma função inteira), podemos utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para concluir que

$$\int_C z \cos z^2 dz = \frac{1}{2} \text{sen} z^2 \Big|_0^{\pi i} = -\frac{\text{sen}(\pi^2)}{2}$$

2. Considere o caminho  $\gamma_1$  que consiste no segmento de recta unindo o ponto inicial  $0$  ao ponto final  $\sqrt{2}e^{i\pi/4}$ , e considere também o caminho  $\gamma_2$  entre esses mesmos pontos dado pela parábola  $t \mapsto t + it^2$ .

a) Calcule, utilizando a definição,  $\int_{\gamma_k} e^z dz$ , com  $k = 1, 2$ .

b) Calcule  $\int_{\gamma_k} \bar{z}^2 dz$  com  $k = 1, 2$ .

c) Comente os resultados que obteve nas alíneas anteriores.

**Resolução:**

Observe-se primeiro que  $\sqrt{2}e^{i\pi/4} = 1 + i$ . Com  $t \in [0, 1]$ , parametrizações possíveis são:  $\gamma_1(t) = (1-t)0 + t(1+i) = t + ti$  e  $\gamma_2(t) = t + t^2i$ .

a)

$$\int_{\gamma_1} e^z dz = \int_0^1 e^{t(1+i)}(1+i) dt = e^{t(1+i)} \Big|_0^1 = e^{1+i} - 1$$

e

$$\int_{\gamma_2} e^z dz = \int_0^1 e^{t+it^2}(1+2ti) dt = e^{t+it^2} \Big|_0^1 = e^{1+i} - 1$$

b)

$$\int_{\gamma_1} \bar{z}^2 dz = \int_0^1 (t-ti)^2(1+i) dt = (1-i)^2(1+i) \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}(1-i)$$

e

$$\int_{\gamma_2} \bar{z}^2 dz = \int_0^1 (t-t^2i)^2(1+2ti) dt = \int_0^1 (t^2 + 3t^4 - 2it^5) dt = \frac{14}{15} - \frac{i}{3}$$

c) A função  $z \mapsto e^z$  é holomorfa em  $\mathbb{C}$  e portanto o integral é independente do caminho (consequência do Teorema de Cauchy). Pode-se notar ainda que nestas condições é válido o Teorema Fundamental e portanto

$$\int_{\gamma_1} e^z dz = e^z \Big|_0^{1+i} = e^{1+i} - 1$$

Por outro lado, a função  $f(z) = \bar{z}^2$  não é holomorfa em nenhum ponto de  $\mathbb{C}$  (porquê?), e portanto os integrais sobre caminhos homotópicos podem depender dos caminhos, o que sucede no presente exercício.

3. Seja

$$f(z) = z^{-1+i} = \exp[(-1+i)\log z] \quad , \quad |z| > 0 \text{ e } 0 < \arg z < 2\pi$$

Calcule

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz$$

onde a curva é percorrida no sentido positivo.

**Resolução:**

Começamos por notar que a função integranda não é analítica no semi-eixo real negativo. Uma parametrização possível para a curva será  $z(t) = e^{it}$  com  $0 < t < 2\pi$ . Assim

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=1} f(z) dz &= \int_0^{2\pi} \exp[(-1+i)\log z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \exp[(-1+i)it] i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} i \exp[(-1+i)it + it] dt \\ &= \int_0^{2\pi} i e^{-t} dt = (-i e^{-t}) \Big|_0^{2\pi} = i(1 - e^{-2\pi}) \end{aligned}$$

4. Seja  $\gamma(t) = Re^{it}$  para  $0 \leq t \leq \pi$ . Mostre que se  $R > 2$ , então

$$\left| \int_{\gamma} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz \right| \leq \pi \frac{R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)}$$

**Resolução:**

Utilizando a parametrização sugerida

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz \right| &= \left| \int_0^{\pi} \frac{2R^2 e^{12t} - 1}{R^4 e^{i4t} + 5R^2 e^{i2t} + 4} Rie^{it} dt \right| \\ &\leq \int_0^{\pi} \frac{|2R^2 e^{12t} - 1|}{|R^4 e^{i4t} + 5R^2 e^{i2t} + 4|} |Rie^{it}| dt \\ &\leq \int_0^{\pi} \frac{|2R^2 e^{12t}| + |-1|}{|(R^2 e^{i2t} - 1)(R^2 e^{i2t} - 4)|} R dt \\ &\leq \int_0^{\pi} \frac{(2R^2 + 1)R}{(|R^2 e^{i2t}| - |-1|)(|R^2 e^{i2t}| - |-4|)} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{(2R^2 + 1)R}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)} dt = \pi \frac{R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)} \end{aligned}$$

como se queria mostrar.

5. Seja  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  a elipse  $|z - \pi i| + |z - 2\pi i| = \frac{7\pi}{2}$ , percorrida no sentido positivo. Calcule

- (a)  $\oint_{\Gamma} z^3 \cosh z dz$       (b)  $\oint_{\Gamma} \frac{ze^{-z}}{z - \frac{i}{2}} dz$       (c)  $\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2 + \pi^2} dz$
- (d)  $\oint_{\Gamma} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz$       (e)  $\oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^2(z - 2\pi i)^3}$       (f)  $\oint_{\Gamma} \frac{\cos z}{(z - i\pi)^{11}} dz$

**Resolução:**

(a) Dado que  $z^3 \cosh z$  é uma função inteira e  $\Gamma$  é uma curva fechada, regular e simples, podemos usar o Teorema de Cauchy e concluir que

$$\oint_{\Gamma} z^3 \cosh z dz = 0$$

(b) A função  $\frac{ze^{-z}}{z - \frac{i}{2}}$  é o quociente de funções inteiras, pelo que será analítica no conjunto  $\mathbb{C} \setminus \{z : z - \frac{i}{2} = 0\}$ , ou seja em  $\mathbb{C} \setminus \{\frac{i}{2}\}$ . Resta-nos averiguar, qual a posição do ponto  $\frac{i}{2}$  relativamente à elipse. Atendendo a que

$$\left| \frac{i}{2} - i\pi \right| + \left| \frac{i}{2} - 2\pi i \right| = 3\pi - 1 < \frac{7\pi}{2} = 3\pi + \frac{\pi}{2}$$

tem-se que  $\frac{i}{2}$  pertence à região interior a  $\Gamma$ . Dado que  $ze^{-z}$  é uma função inteira e  $\Gamma$  é uma curva fechada, regular e simples, aplicando a fórmula integral de Cauchy obtemos

$$\oint_{\Gamma} \frac{ze^{-z}}{z - \frac{i}{2}} dz = 2\pi i z e^{-z} \Big|_{z=i/2} = -\pi e^{-i/2}$$

(c) A função  $\frac{1}{z^2 + \pi^2}$  é analítica em  $\mathbb{C} \setminus \{-\pi i, \pi i\}$ , e atendendo a que

$$|\pi i - \pi i| + |\pi i - 2\pi i| = \pi < 7\pi/2 \quad \text{e} \quad |-\pi i - \pi i| + |-\pi i - 2\pi i| = 5\pi > 7\pi/2$$

tem-se que  $-\pi i$  não pertence à região interior a  $\Gamma$  e  $\pi i$  pertence à região interior a  $\Gamma$ . Escrevendo

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2 + \pi^2} dz = \oint_{\Gamma} \frac{\frac{1}{z+\pi i}}{z - \pi i} dz$$

e atendendo a que a função  $\frac{1}{z+\pi i}$  é analítica na região interior a  $\Gamma$ , tem-se, por aplicação da Fórmula Integral de Cauchy

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2 + \pi^2} dz = 2\pi i \frac{1}{z + \pi i} \Big|_{z=i\pi} = 1$$

(d) A função  $\frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)}$  é analítica em  $\mathbb{C} \setminus \{0, \frac{\pi i}{2}\}$ , e atendendo a que

$$|0 - \pi i| + |0 - 2\pi i| = 3\pi < 7\pi/2 \quad \text{e} \quad \left| \frac{\pi i}{2} - \pi i \right| + \left| \frac{\pi i}{2} - 2\pi i \right| = 2\pi < 7\pi/2$$

tem-se que tanto 0 como  $\frac{\pi i}{2}$  pertencem à região interior a  $\Gamma$ . Podemos escrever

$$\oint_{\Gamma} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz = \oint_{\Gamma_1} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz$$

em que (por exemplo)

$$\Gamma_1 = \{z : |z| < \frac{1}{2}\} \quad \text{e} \quad \Gamma_2 = \{z : |z - \frac{\pi i}{2}| < \frac{1}{2}\}$$

Então

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz &= \oint_{\Gamma_1} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz \\ &= \oint_{\Gamma_1} \frac{\frac{5z - \pi i}{2z - \pi i}}{z^2} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{\frac{5z - \pi i}{z^2}}{2z - \pi i} dz \end{aligned}$$

Dado que a função  $\frac{5z - \pi i}{2z - \pi i}$  é analítica na região interior a  $\Gamma_1$ , tem-se, por aplicação da Fórmula Integral de Cauchy para as derivadas ( $n = 2$ )

$$\oint_{\Gamma_1} \frac{\frac{5z - \pi i}{2z - \pi i}}{z^2} dz = 2\pi i \left( \frac{5z - \pi i}{2z - \pi i} \right)' \Big|_{z=0} = -6$$

Por outro lado, dado que a função  $\frac{5z - \pi i}{z^2}$  é analítica na região interior a  $\Gamma_2$ , tem-se, por aplicação da Fórmula Integral de Cauchy

$$\oint_{\Gamma_2} \frac{5z - \pi i}{z^2} dz = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma_2} \frac{5z - \pi i}{z - \frac{\pi i}{2}} dz = \pi i \frac{5z - \pi i}{z^2} \Big|_{z=\pi i/2} = 6$$

Finalmente

$$\oint_{\Gamma} \frac{5z - \pi i}{z^2(2z - \pi i)} dz = -6 + 6 = 0$$

(e) Seguindo os passos da alínea anterior, a função  $\frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3}$  é analítica em  $\mathbb{C} \setminus \{0, 2\pi i\}$ , e é fácil de verificar que tanto 0 como  $2\pi i$  pertencem à região interior a  $\Gamma$ . Podemos escrever

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz = \oint_{\Gamma_1} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz$$

em que (por exemplo)

$$\Gamma_1 = \{z : |z| < \frac{1}{2}\} \quad \text{e} \quad \Gamma_2 = \{z : |z - 2\pi i| < \frac{1}{2}\}$$

Então

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz &= \oint_{\Gamma_1} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz \\ &= \oint_{\Gamma_1} \frac{\frac{1}{(z-2\pi i)^3}}{z^2} dz + \oint_{\Gamma_2} \frac{\frac{1}{z^2}}{(z - 2\pi i)^3} dz \end{aligned}$$

Dado que a função  $\frac{1}{(z-2\pi i)^3}$  é analítica na região interior a  $\Gamma_1$ , tem-se, por aplicação da Fórmula Integral de Cauchy para as derivadas ( $n = 2$ )

$$\oint_{\Gamma_1} \frac{\frac{1}{(z-2\pi i)^3}}{z^2} dz = 2\pi i \left( \frac{1}{(z - 2\pi i)^3} \right)' \Big|_{z=0} = -\frac{3i}{8\pi^3}$$

Por outro lado, dado que a função  $\frac{1}{z^2}$  é analítica na região interior a  $\Gamma_2$ , tem-se, por aplicação da Fórmula Integral de Cauchy para as derivadas ( $n = 3$ )

$$\oint_{\Gamma_2} \frac{\frac{1}{z^2}}{(z - 2\pi i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2} \left( \frac{1}{z^2} \right)'' \Big|_{z=2\pi i} = \frac{3i}{8\pi^3}$$

Finalmente

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2(z - 2\pi i)^3} dz = -\frac{3i}{8\pi^3} + \frac{3i}{8\pi^3} = 0$$

(f) A função  $\frac{\cos z}{(z - i)^{11}}$  é analítica em  $\mathbb{C} \setminus \{i\}$  e é fácil de verificar que  $i$  pertence à região interior a  $\Gamma$ . Pela fórmula integral de Cauchy para as derivadas ( $n = 10$ )

$$\oint_{\Gamma} \frac{\cos z}{(z - i)^{11}} dz = 2\pi i \frac{1}{10!} (\cos z)^{(10)} \Big|_{z=i} = -\frac{2}{10!} \pi i \cos i$$

6. Considere a função complexa definida por

$$f(z) = f(x + iy) = x^2 - y^2 - 2xy + 2y + i(x^2 - y^2 + 2xy - 2x).$$

Justificando pormenorizadamente a sua resposta, determine o valor do integral

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-2)^2} dz,$$

onde  $C = \{z \in \mathbb{C} : |z - i| = 4\}$  é percorrida uma vez no sentido directo.

**Resolução:**

Começemos por analisar o domínio de analiticidade da função integranda  $\frac{f(z)}{(z-2)^2}$ , pelo que necessitamos de saber quais os pontos de  $\mathbb{C}$  onde a função  $f$  admite derivada. Sendo

$$\operatorname{Re} f = u(x, y) = x^2 - y^2 - 2xy + 2y \quad \text{e} \quad \operatorname{Im} f = v(x, y) = x^2 - y^2 + 2xy - 2x$$

tem-se

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y - 2x + 2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + 2y - 2, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -2y + 2x$$

É óbvio que todas estas funções são contínuas em  $\mathbb{R}^2$  e que as condições de Cauchy Riemann se verificam para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Podemos então concluir que  $f$  é uma função inteira, pelo que  $\frac{f(z)}{(z-2)^2}$  é analítica em  $\mathbb{C} \setminus \{2\}$ . Dado que  $C$  é uma curva fechada, simples e regular, e que 2 pertence à sua região interior, por aplicação da fórmula integral de Cauchy para as derivadas ( $n = 1$ ), concluímos

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-2)^2} dz = 2\pi i f'(2) = 2\pi i \left( \frac{\partial u}{\partial x}(2, 0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(2, 0) \right) = 2\pi i(4 + 2i)$$

7. *Teorema de Liouville:* Mostre que se  $f$  é inteira e limitada então  $f$  é constante em  $\mathbb{C}$ .

**Sugestão:** Utilize a fórmula integral de Cauchy para mostrar que  $f'(z) = 0$ .

**Resolução:**

Seguindo a sugestão, vamos demonstrar que nas condições dadas  $f'(z) = 0$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Visto  $f$  ser inteira, podemos aplicar a Fórmula Integral de Cauchy para concluir que

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$$

para qualquer curva de Jordan  $C$  percorrida uma vez no sentido directo e tal que  $z$  pertença à sua região interior. Em particular

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z|=R} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$$

isto é, sendo  $C$  a circunferência de raio  $R$  centrada em  $z$ . Por outro lado atendendo a que  $f$  é limitada, existe  $M > 0$  tal que

$$|f(z)| \leq M, \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Tem-se então que

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|w-z|=R} \left| \frac{f(w)}{(w-z)^2} \right| |dw| \leq \frac{M}{2\pi} \oint_{|w-z|=R} \frac{1}{R^2} |dw| = \frac{M2\pi R}{2\pi R^2} = \frac{M}{R}$$

Ou seja, dado qualquer número complexo  $z$

$$|f'(z)| \leq \frac{M}{R}, \quad \forall R \in \mathbb{R}^+$$

Visto  $R$  ser arbitrário, quando  $R \rightarrow \infty$

$$|f'(z)| \leq 0 \quad \Rightarrow \quad |f'(z)| = 0 \quad \Rightarrow \quad f'(z) = 0$$

Seja  $f = u + iv$ . Como  $f'(z) = 0$ , resulta do teorema de Cauchy-Riemann que todas as derivadas parciais de  $u$  e  $v$  são nulas para qualquer  $z \in \mathbb{C}$ . Desta forma,  $f$  é constante em  $\mathbb{C}$ .