

2º TESTE DE ÁLGEBRA LINEAR CURSO: Informática

2º TESTE – 14/XII/98 – Turma 10102 A Duração: 50mn

1 – (6 valores) Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear definida por

$$T(x, y) = (x + y, -x - y)$$

- (a) Calcule a matriz A que representa T em relação à base canónica de \mathbb{R}^2 , e determine a imagem $\mathcal{I}(T)$ de T indicando a sua dimensão e uma base.
- (b) Sejam $v_1 = (1, 2)$ e $v_2 = (1, 3)$ dois vectores de \mathbb{R}^2 . Mostre que $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ é uma base de \mathbb{R}^2 e determine a matriz B que representa T na base \mathcal{B} .

2 – (6 valores) Considere o espaço euclidiano \mathbb{R}^3 munido do produto interno usual e seja $S \subset \mathbb{R}^3$ o subespaço gerado pelos vectores $(1, 0, 1)$ e $(1, 1, 0)$.

- (a) Determine bases ortonormadas para S e S^\perp .
- (b) Determine o ponto de S mais próximo de $(1, 1, 1)$.

3 – (6 valores) Seja \mathcal{M}_2 o espaço linear das matrizes reais (2×2) e seja $T : \mathcal{M}_2 \rightarrow \mathcal{M}_2$ a aplicação definida por

$$T(A) = AP - PA,$$

onde $P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Mostre que T é uma transformação linear.
- (b) Determine o núcleo $\mathcal{N}(T)$ de T .

4 – (2 valores) Seja V um espaço vectorial e $R, S : V \rightarrow V$ duas transformações lineares tais que $RS = SR$. Mostre que $R(\mathcal{N}(S)) \subset \mathcal{N}(S)$, i.e. $u \in \mathcal{N}(S) \Rightarrow R(u) \in \mathcal{N}(S)$, e que $R(\mathcal{I}(S)) \subset \mathcal{I}(S)$, i.e. $u \in \mathcal{I}(S) \Rightarrow R(u) \in \mathcal{I}(S)$.