

2º EXAME DE ANÁLISE MATEMÁTICA I
(LEIC-TAGUS, LERCI, LEGI E LEE)

1º SEM. 2004/05 24/JAN/2005, 9.00 - V.1 DURAÇÃO: 2H

I (2,5 val.)

1. Considere o conjunto $A = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x^2}{2+x} \geq 1\right\}$.

- (a) Mostre que $A =]-2, -1] \cup [2, +\infty[$.
- (b) Determine caso existam, ou justifique que não existem, o conjunto dos minorantes, o conjunto dos majorantes, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo de $A \cap]-\infty, 2]$.

2. Considere a sucessão (x_n) definida por

$$x_1 = 0 \quad \text{e} \quad x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2-x_n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Mostre que $0 \leq x_n < 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, e que (x_n) é estritamente crescente.
- (b) Justifique que (x_n) é convergente e calcule o seu limite.

II (2,5 val.)

1. Calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+2} \right)^{n+1}.$$

2. Calcule

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^{n+1}}.$$

3. Determine a natureza da seguinte série numérica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^5}{n!}.$$

4. Determine o conjunto dos pontos $x \in \mathbb{R}$ onde a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n \sqrt{n+3}}$$

é (i) absolutamente convergente, (ii) simplesmente convergente e (iii) divergente.

III (2,0 val.)

Considere a função $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{e^x}{x}, \quad \forall x \neq 0.$$

- (a) Determine os intervalos de monotonia e extremos de f .
- (b) Determine as concavidades e inflexões de f .
- (c) Determine as assíntotas ao gráfico de f .
- (d) Esboce o gráfico de f e indique o seu contradomínio.

IV (3,0 val.)

1. Considere a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1 - x}{x}, & \text{se } x < 0; \\ \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{x+1}\right), & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

- (a) Mostre que g é diferenciável no ponto zero com $g'(0) = 1/2$.
- (b) Seja $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável, tal que $h(1) = 0$ e $h'(1) = 2$. Determine $(g \circ h)'(1)$.

2. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + x^3)^{1/\log(x)}.$$

3. Seja $\phi :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável, tal que

$$\phi(2n) = -2n \quad \text{e} \quad \phi(2n-1) = 2n-1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Mostre que existem sucessões (a_n) e (b_n) , ambas com limite $+\infty$, tais que

$$\lim \phi'(a_n) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim \phi'(b_n) = -\infty.$$