

PROPOSIÇÃO: *Dado um autômato finito determinista $D = (Q, I, \delta, q_0, F)$ existe uma gramática regular G tal que $L_G = L_D$.*

Prova (esboço):

(A) Considere-se a gramática regular

$$G = (V, I, P, S)$$

tal que

- $V = Q$
- P é tal que¹
 - $q_1 \rightarrow aq_2 \in P$ sse $\delta(q_1, a) = q_2$
 - $q \rightarrow \epsilon \in P$ sse $q \in F$
- $S = q_0$.

(B) Haveria agora que provar que $L_D = L_G$.

PROPOSIÇÃO: *Dado um autômato finito não determinista $A = (Q, I, \delta, q_0, F)$ existe uma gramática regular G tal que $L_G = L_A$.*

Prova:

(A) Considere-se a gramática regular

$$G = (V, I, P, S)$$

tal que

- $V = Q$
- P é tal que
 - $q_1 \rightarrow aq_2 \in P$ sse $q_2 \in \delta(q_1, a)$
 - $q \rightarrow \epsilon \in P$ sse $q \in F$
- $S = q_0$.

(B) Haveria agora que provar que $L_A = L_G$.

¹Certos autores incluem também a condição $q \rightarrow a \in P$ sse $\delta(q, a) \in F$ mas esta condição não é estritamente necessária.

Exemplo: Para cada um dos autómatos definidos de seguida pretende-se construir, de acordo com uma das proposições anteriores, uma gramática regular G tal que $L_G = L_D$:

a) $D = (Q, I, \delta, q_0, F)$ com $Q = \{s, t, u, v\}$, $I = \{0, 1\}$, $q_0 = s$, $F = \{v\}$ e

- $\delta(s, 0) = v$, $\delta(s, 1) = t$
- $\delta(t, 0) = u$, $\delta(t, 1) = v$
- $\delta(u, 1) = t$

D é uma autómato finito determinista pelo que, de acordo com uma das proposições anteriores, uma gramática regular G tal que $L_G = L_D$ é $G = (V, I, P, S)$ em

$$\begin{array}{l} s \rightarrow 0v \mid 1t \\ t \rightarrow 0u \mid 1v \\ u \rightarrow 1t \\ v \rightarrow \epsilon \end{array}$$

que $V = Q$, $S = s$ e $P ::$

b) $A = (Q, I, \delta, q_0, F)$ com $Q = \{a, b, c, d\}$, $I = \{0, 1\}$, $q_0 = a$, $F = \{d\}$ e

- $\delta(a, 0) = \{a, b\}$, $\delta(a, 1) = \{b\}$
- $\delta(b, 0) = \{c\}$, $\delta(b, 1) = \{b\}$
- $\delta(c, 0) = \{a\}$, $\delta(c, 1) = \{c, d\}$
- $\delta(d, 0) = \{c\}$, $\delta(d, 1) = \{b\}$

A é uma autómato finito não determinista, pelo que, de acordo com uma das proposições anteriores, uma gramática regular G tal que $L_G = L_A$ é

$$\begin{array}{l} a \rightarrow 0a \mid 0b \mid 1b \\ b \rightarrow 0c \mid 1b \\ c \rightarrow 0a \mid 1c \mid 1d \\ d \rightarrow 0c \mid 1b \mid \epsilon \end{array}$$

$G = (V, I, P, S)$ em que $V = Q$, $S = a$ e $P ::$