

Análise Matemática IV

Problemas de Análise Complexa

Semana 1

1. Escreva os seguintes números complexos na forma $a + bi$ e represente-os geometricamente no plano de Argand:

a) $(2 + i)(1 - i)$

b) $\frac{1}{1-i}$

c) $\frac{2+i}{1+i}$

d) $(2 - 3i)^2$.

e) $\overline{(1 - 2i)^3}$

2. Determine o módulo e o argumento dos seguintes números complexos e represente-os geometricamente:

a) 3

b) -2

c) $1 + i$

d) $3 - 4i$

e) $-1 - i$

3. Calcule e represente geometricamente os números complexos

a) $\sqrt[3]{i}$

b) $\sqrt[4]{-1}$

c) $\sqrt{1 - i}$

d) $\sqrt[4]{z^6}$

e) $(\sqrt[4]{z})^6$

(Compare os resultados desta alínea com os da alínea anterior. Tente determinar em que casos é que $\sqrt[n]{z^m}$ e $(\sqrt[n]{z})^m$ representam os mesmos complexos.)

4. Mostre as seguintes desigualdades e indique em que condições as igualdades são satisfeitas

a) $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$

- b) $|z + w| \leq |z| + |w|$
- c) $|z + w| \geq ||z| - |w||$
- d) $|z - |z|| \leq |z| \cdot |\arg z|$

5. Esboce no plano complexo os conjuntos dos números que satisfazem as relações seguintes

- a) $|z - 2| = 3$
- b) $|z - 2| + |z + 2| = 5$
- c) $|z - 1| - |z + 1| > 2$
- d) $|z| = \operatorname{Re}(z) + 2$
- e) $\operatorname{Im}(z) + \operatorname{Re}(z) < 1$
- f) $\operatorname{Im}\left(\frac{z-i}{z-1}\right) = 0$
- g) $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z-i}\right) = 0$

6. Determine todos os vértices de um polígono regular de n lados, centrado na origem, sabendo que um deles é representado pelo complexo z_1 .

7. Sejam z_1, z_2 e z_3 três números complexos de módulo unitário satisfazendo $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. Mostre que esses complexos são vértices de um triângulo equilátero.

8. Considere n complexos não nulos, z_1, \dots, z_n , todos do mesmo lado de uma dada recta r que passa pela origem. Mostre que os complexos $z_1^{-1}, \dots, z_n^{-1}$ também estão todos do mesmo lado de uma recta (qual?) e que se tem $z_1 + \dots + z_n \neq 0$ e $z_1^{-1} + \dots + z_n^{-1} \neq 0$. (Sugestão: considere primeiro o caso de r ser o eixo imaginário $\operatorname{Re}(z) = 0$.)