

Instituto Superior Técnico
Álgebra Linear 2006/2007 (AL-14)
Primeiro mini-teste, 3 de Abril de 2007, 12h
Duração: 40 minutos

Versão D

Identificação

Número: _____

Nome: _____

Respostas

1a	<input type="checkbox"/>	2a	<input type="checkbox"/>	3a	<input type="checkbox"/>	4a	<input type="checkbox"/>	5a	<input type="checkbox"/>
1b	<input type="checkbox"/>	2b	<input type="checkbox"/>	3b	<input type="checkbox"/>	4b	<input type="checkbox"/>	5b	<input type="checkbox"/>
1c	<input type="checkbox"/>	2c	<input type="checkbox"/>	3c	<input type="checkbox"/>	4c	<input type="checkbox"/>	5c	<input type="checkbox"/>
1d	<input type="checkbox"/>	2d	<input type="checkbox"/>	3d	<input type="checkbox"/>	4d	<input type="checkbox"/>	5d	<input type="checkbox"/>

Instruções

1. Este é um teste de *escolha múltipla*.
2. Nas página seguintes há vinte alíneas distribuídas por cinco perguntas. Cada alínea contém uma afirmação que pode ser *verdadeira* ou *falsa*.
3. *Na folha de rosto* deve assinalar com **V** as afirmações verdadeiras e com **F** as afirmações falsas, podendo sempre em cada alínea optar por não responder.
4. As respostas certas têm *pontuação positiva* e as respostas erradas têm *pontuação negativa*. As alíneas sem resposta têm *pontuação nula*.
5. No fim do teste deve *entregar* ao docente apenas a *folha de rosto* devidamente identificada e com as respostas assinaladas.

Pergunta 1

Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ i & 0 & i \end{bmatrix}$.

a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & i & 1 \\ 1 & i & 0 \\ 0 & -2i & -1 \end{bmatrix}$.

Cotação: $V = -0.3, F = +1.0$

b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & i \\ 0 & -1 & -2i \end{bmatrix}$.

Cotação: $V = +1.0, F = -0.3$

c) A não tem inversa.

Cotação: $V = -1.7, F = +1.0$

d) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & i \\ 0 & 1 & -2i \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Cotação: $V = -1.7, F = +1.0$

Pergunta 2

Seja $\left[\begin{array}{ccc|c} a & 0 & b & 2 \\ a & a & 4 & 4 \\ 0 & a & 2 & b \end{array} \right]$ a matriz aumentada de um sistema de equações lineares.

a) Se $b = 2$ o sistema é possível e indeterminado.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

b) Se $a = 0$ existem valores de b para os quais o sistema é possível.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

c) Se $a = 0$ o sistema é sempre possível independentemente do valor de b .

Cotação: V = -1.0, F = +1.0

d) Se $a = 1$ o sistema é impossível.

Cotação: V = -1.0, F = +1.0

Pergunta 3

a) $A + B = B + A$ para quaisquer matrizes $m \times n$ A e B .

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

b) $AB = BA$ para quaisquer matrizes $n \times n$ A e B .

Cotação: V = -1.5, F = +1.0

c) $(A + B)^2 = A^2 + AB + B^2$ para quaisquer matrizes $n \times n$ A e B .

Cotação: V = -0.5, F = +1.0

d) Existem matrizes A e B tais que $AB = BA$.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

Versão D

Pergunta 4

a) O espaço das colunas da matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & i & 3i \\ 2 & 0 & 3i \\ 3 & i & i \\ 4 & 0 & i \end{bmatrix}$$

coincide com o núcleo da matriz

$$[1 \quad -1 \quad -1 \quad 1]$$

(visto como um subespaço de \mathbb{C}^4).

Cotação: V = +1.0, F = -0.2

b) O vector $(1, 1, 1, 1) \in \mathbb{C}^4$ é combinação linear dos vectores $(1, 2, 3, 4)$, $(i, 0, i, 0)$ e $(3i, 3i, i, i)$.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

c) O subconjunto do espaço vectorial complexo dos polinómios de coeficientes complexos $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ formado pelos polinómios

$$1 + 2z + 3z^2 + 4z^3$$

$$i + iz^2$$

$$3i + 3iz + iz^2 + iz^3$$

é linearmente independente.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

d) O conjunto formado pelas funções e^x , $\sin x$ e $\cos x$ gera todo o espaço vectorial real das funções reais de variável real.

Cotação: V = -1.8, F = +1.0

Versão D

Pergunta 5

Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

a) A característica de A é 3.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

b) A dimensão do espaço das colunas de A é 3.

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

c) O conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ é uma base do espaço das colunas de A .

Cotação: V = +1.0, F = -1.0

d) A nulidade de A é 3.

Cotação: V = -1.0, F = +1.0