

Instituto Superior Técnico  
Álgebra Linear 2006/2007 (AL-14)  
Segundo mini-teste, 8 de Maio de 2007, 12h  
Duração: 40 minutos

## Versão B

### Identificação

Número: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

### Respostas

1a	<input type="checkbox"/>	2a	<input type="checkbox"/>	3a	<input type="checkbox"/>	4a	<input type="checkbox"/>	5a	<input type="checkbox"/>
1b	<input type="checkbox"/>	2b	<input type="checkbox"/>	3b	<input type="checkbox"/>	4b	<input type="checkbox"/>	5b	<input type="checkbox"/>
1c	<input type="checkbox"/>	2c	<input type="checkbox"/>	3c	<input type="checkbox"/>	4c	<input type="checkbox"/>	5c	<input type="checkbox"/>
1d	<input type="checkbox"/>	2d	<input type="checkbox"/>	3d	<input type="checkbox"/>	4d	<input type="checkbox"/>	5d	<input type="checkbox"/>



## Instruções

1. Este é um teste de *escolha múltipla*.
2. Nas página seguintes há vinte alíneas distribuídas por cinco perguntas. Cada alínea contém uma afirmação que pode ser *verdadeira* ou *falsa*.
3. *Na folha de rosto* deve assinalar com **V** as afirmações verdadeiras e com **F** as afirmações falsas, podendo sempre em cada alínea optar por não responder.
4. As respostas certas têm *pontuação positiva* e as respostas erradas têm *pontuação negativa*. As alíneas sem resposta têm *pontuação nula*.
5. No fim do teste deve *entregar* ao docente apenas a *folha de rosto* devidamente identificada e com as respostas assinaladas.



Versão B

### Pergunta 1

Seja  $V \subset \mathbb{R}^3$  o conjunto descrito pelas equações cartesianas

$$x - y + z = 2$$

$$x + y - z = 0$$

a)  $V$  é um plano-2 de  $\mathbb{R}^3$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

b)  $V$  é um plano-3 de  $\mathbb{R}^3$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

$$c) V = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + L \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

$$d) V = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + L \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right).$$

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

### Pergunta 2

$$\text{Seja } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & i & 2i \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2i & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

a)  $\det A = -3 + 12i$ .

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

b)  $\det A = -3 + i$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

Versão B

c)  $\det A = 0$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

d)  $\det A = -3 + 6i$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

### Pergunta 3

Seja  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ .

a)  $\det A = 11$ .

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

b)  $A_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ .

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

c)  $(\text{Cof } A)_{32} = -7$ .

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

d)  $(A^{-1})_{23} = -1$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

### Pergunta 4

Seja  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  a função definida por

$$T(x, y, z) = (x + y + z, y + 3z).$$

a) A matriz de  $T$  em relação às bases canônicas de  $\mathbb{R}^3$  e  $\mathbb{R}^2$  é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

*Cotação:*  $V = -0.5$ ,  $F = +1.0$

Versão B

b) A matriz de  $T$  em relação às bases canónicas de  $\mathbb{R}^3$  e  $\mathbb{R}^2$  é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} .$$

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -0.5$

c) A matriz de  $T$  em relação às bases canónicas de  $\mathbb{R}^3$  e  $\mathbb{R}^2$  é

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} .$$

*Cotação:*  $V = -1.5$ ,  $F = +1.0$

d)  $T$  não é uma transformação linear.

*Cotação:*  $V = -1.5$ ,  $F = +1.0$

### Pergunta 5

Seja  $T : \mathcal{P}_2 \rightarrow \mathcal{P}_2$  a transformação linear cuja matriz em relação à base canónica do espaço de polinómios  $\mathcal{P}_2$  é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e sejam dados os seguintes polinómios:

$$p_1(x) = 1 + x + x^2$$

$$p_2(x) = 1 + x$$

$$p_3(x) = 1$$

a)  $T(1 + 3x^2) = 5 + x + x^2$ .

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

b)  $T(1 + 3x^2) = 7 + 5x + x^2$ .

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$

Versão B

c) A matriz de  $T$  em relação à base ordenada  $(p_1, p_2, p_3)$  é

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} .$$

*Cotação:*  $V = -1.0$ ,  $F = +1.0$

d) A matriz de  $T$  em relação à base ordenada  $(p_3, p_2, p_1)$  é

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} .$$

*Cotação:*  $V = +1.0$ ,  $F = -1.0$